

# 抗結核藥的副作用



小部份病人可能會出現治療副作用，病人須及早向醫護人員報告。常見或嚴重的副作用包括：

1. 藥物過敏：任何藥物均可引起藥物過敏，常見症狀包括皮膚瘙癢、皮疹、蕁麻疹，或發燒。輕度過敏會自發消失或在接受抗組胺藥後改善，較嚴重的可能會持續或惡化。
2. 肝毒性：異煙肼、利福平及吡嗪酰胺均可引起肝臟發炎(肝毒)。典型症狀包括食慾不振，持續噁心(超過幾個小時)、嘔吐和黃疸，診斷肝毒須驗血。
3. 視力受損：乙胺丁醇可導致視神經發炎(風險1%以下)。如果視力持續模糊超過幾個小時，須立即報告。異煙肼也可能導致此情況，但較為罕見。
4. 周邊神經病變：異煙肼可引起神經發炎，導致手腳有麻木或異常感覺。
5. 痛風發作或關節不適：吡嗪酰胺可引起副作用。
6. 耳毒性或前庭症狀：注射藥物如鏈霉素可引起前庭耳蝸神經受損，出現耳鳴、頭暈或甚至聽覺受影響。
7. 腎毒性：注射藥物可損害腎臟，診斷腎毒須驗血。
8. 藥物相互作用：利福平會影響某些藥物的代謝，例如：抗凝藥，口服避孕藥，一些用於治療糖尿病的藥物，以及一些用於治療愛滋病的抗逆轉錄病毒藥物。